

Avifauna em um parque urbano

**AVIFAUNA DO SOLO SAGRADO DO GUARAPIRANGA (SÃO PAULO,
BRASIL)**

Fernando Igor de Godoy^{1}, Cristiane Espinosa Bolochio² & Maria Socorro Silva Pereira Lippi³*

¹ Universidade Federal de São Carlos, Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais, Rodovia Washington Luiz, Km 235, CEP 13565-905. São Carlos, SP, Brasil.

² Zoológico de Guarulhos, Av. Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa De França, CEP 07081-120. Guarulhos, SP, Brasil

³ Núcleo Interdisciplinar de Ciências Ambientais, Universidade de Santo Amaro, Rua Prof. Enéas de Siqueira Neto, 340, Jardim das Imbuías. CEP 04829-300, São Paulo, SP, Brasil.

E-mails: igorfernando@hotmail.com (*autor correspondente); cristianebolochio@gmail.com; sopeli4@gmail.com.

MATERIAL SUPLEMENTAR

Tabela S1. Avifauna registrada no Solo Sagrado do Guarapiranga. Registro: A – auditivo; G - gravação de vocalização; V – visualização; F – fotografia. FO: Frequência de Ocorrência, expressa em porcentagem. Status: classificação da espécie de acordo com a FO obtida. Migração: Migratória (Mi), Migratória Parcialmente (Mp). Dieta – Categorias alimentares: Frugívoras (FR), Onívoras (ON), Insetívoras (IN), Carnívoras (CA), Granívoras (GR), Necrófagas (DE), Nectarívoras (NE), Piscívoras (PI) e Planctívoras (PL). Ambiente: A – aquático; B – antrópico; C – palustre; D – mata; E – bosques; F- áreas abertas. End.: Endemismo da Mata Atlântica (MA).

Table S1. Avifauna recorded in the Solo Sagrado do Guarapiranga. Record: A - audio; G - vocalization; V - visualization; F - photography. FO: Frequency of Occurrence, expressed as a percentage. Status: classification of the species according to the FO obtained. Migration: Migratory (Mi), Partially Migratory (Mp). Guild – Feeding categories: Frugivorous (FR), Omnivorous (ON), Insectivorous (IN), Carnivorous (CA), Granivorous (GR), Necrophagous (DE), Nectarivorous (NE), Piscivorous (PI) and Planktivorous (PL). Environment: A - aquatic; B - anthropic; C - marsh; D - forest; E - grove; F- open areas. End.:Atlantic Forest Endemism (MA).

Nome do Táxon	Nome em Português	Registro	FO (%)	Status	Migração	Dieta	Ambiente	End.	Período																	
									jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun						
Tinamiformes																										
Tinamidae																										
<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inambuguaçu	GV	73,47	frequente		On	D																			
<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	inambu-chororó	GF	10,20	rara no local		On	F																			
Anseriformes																										
Anatidae																										
<i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)	marreca-caneleira	F	25,45	ocasional	Mp	PI	A,C																			
<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	F	67,27	frequente		PI	A,C,F																			
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí	F	98,18	muito comum		PI	A,C																			
<i>Anas bahamensis</i> Linnaeus, 1758	marreca-toicinho	F	25,45	ocasional		PI	A,C																			
<i>Anas versicolor</i> Vieillot, 1816	marreca-cricri	F	1,82	rara no local	Mp	PI	A																			
Galliformes																										

Nome do Táxon	Nome em Português	Registro	FO (%)	Status	Migração	Dieta	Ambiente	End.	Período															
									jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun				
Cracidae																								
<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacaguaçu	FG	32,65	ocasional		Fr	D,E																	
Podicipediformes																								
Podicipedidae																								
<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador	FG	96,36	muito comum		Pi	A,C																	
Suliformes																								
Phalacrocoracidae																								
<i>Nannopterum brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	F	98,18	muito comum		Pi	A,C																	
Pelecaniformes																								
Ardeidae																								
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	socó-dorminhoco	F	66,07	frequente		Pi	A,C,E																	
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	F	29,09	ocasional		Pi	A,C,E																	
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	F	9,09	rara no local		In	F																	
<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura	F	80,00	frequente		Pi	A,C																	
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca	FG	98,18	muito comum		On	A,C																	
<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira	V	1,82	rara no local		In	E,F																	
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	F	96,36	muito comum		Pi	A,C																	
Threskiornithidae																								
<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	colhereiro	F	1,82	rara no local	Mp	On	A																	
Cathartiformes																								
Cathartidae																								

Nome do Táxon	Nome em Português	Registro	FO (%)	Status	Migração	Dieta	Ambiente	End.	Período													
									jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun		
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu	F	80,00	frequente		De	A,B,C,D,E,F		[Redacted]													
Accipitriformes																						
Pandionidae																						
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	águia-pescadora	F	1,82	rara no local	Mi	Pi	A,E															
Accipitridae																						
<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	gavião-peneira	V	3,64	rara no local		Ca	F															
<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro	FG	85,45	muito comum	Mp	Ca	A,C,E,F		[Redacted]													
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	VG	65,45	frequente		Ca	B,C,D,E,F		[Redacted]													
Gruiformes																						
Aramidae																						
<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	carão	FG	100,00	muito comum		On	A,C,E		[Redacted]													
Rallidae																						
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	FG	61,82	frequente		On	D,E,F	MA	[Redacted]													
<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda	A	1,82	rara no local		On	C															
<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	G	5,45	rara no local		On	C															
<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)	galinha-d'água	FG	100,00	muito comum		On	A,C		[Redacted]													
Charadriiformes																						
Charadriidae																						

Nome do Táxon	Nome em Português	Registro	FO (%)	Status	Migração	Dieta	Ambiente	End.	Período												
									jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	FG	98,21	muito comum		On	A,B,C,F		[Redacted]												
Recurvirostridae										[Redacted]											
<i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817	pernilongo-de-costas-brancas	F	27,27	ocasional		On	A,C		[Redacted]												
Scolopacidae										[Redacted]											
<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-perna-amarela	F	3,64	rara no local	Mi	On	A,F		[Redacted]												
Jacanidae										[Redacted]											
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	F	94,55	muito comum		On	A,C		[Redacted]												
Columbiformes										[Redacted]											
Columbidae										[Redacted]											
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha	F	27,27	ocasional		Gr	E		[Redacted]												
<i>Patagioenas picauro</i> (Temminck, 1813)	asa-branca	F	96,36	muito comum		Fr	B,D,E,F		[Redacted]												
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonaterre, 1792)	pomba-galega	F	8,16	rara no local		Fr	D		[Redacted]												
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa	VG	32,65	ocasional		Fr	D		[Redacted]												
<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	avoante	F	94,55	muito comum		Gr	B,E,F		[Redacted]												
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	FG	80,00	frequente		Fr	B,D,E,F		[Redacted]												
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-de-testa-branca	VG	36,73	ocasional		Fr	D		[Redacted]												
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri	F	2,04	rara no local		Fr	D		[Redacted]												
Cuculiformes										[Redacted]											
Cuculidae										[Redacted]											

Nome do Taxon	Nome em Português	Registro	FO (%)	Status	Migração	Dieta	Ambiente	End.	Período													
									jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun		
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	F	78,18	frequente		In	D,E,F		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	FG	41,82	comum		In	C,E,F					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	F	18,18	ocasional		In	E,F					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Strigiformes																						
Tytonidae																						
<i>Tyto furcata</i> (Temminck, 1827)1	suindara	A	3,03	rara no local		Ca	B		■													
Strigidae																						
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	FG	75,76	frequente		Ca	D,E					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	FG	92,73	muito comum		In	F		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	V	3,03	rara no local		Ca	E					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nyctibiiformes																						
Nyctibiidae																						
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	urutau	FG	15,15	ocasional		In	D					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Caprimulgiformes																						
Caprimulgidae																						
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju	VA	24,24	ocasional	Mp	In	D					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau	FG	42,42	comum		In	C,E,F					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Hydropsalis parvula</i> Gould, 1837	bacurau-chintã	VA	3,03	rara no local	Mp	In	E					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Apodiformes																						
Apodidae																						
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca	V	10,91	ocasional		In	A,B,C,D,E,F		■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Nome do Taxon	Nome em Português	Registro	FO (%)	Status	Migração	Dieta	Ambiente	End.	Período													
									jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun		
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	V	43,64	comum	Mi	In	A,B,C,D,E,F															
Trochilidae																						
<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839)	rabão-branco-acanelado	VA	2,04	rara no local		Ne	D															
<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabão-branco-de-garganta-rajada	F	38,78	comum		Ne	D,E	MA														
<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	F	30,91	ocasional		Ne	E,F															
<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	F	1,82	rara no local	Mp	Ne	E,F	MA														
<i>Anthracothora x nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta	F	7,27	rara no local	Mp	Ne	E,F															
<i>Lophornis chalybeus</i> (Vieillot, 1822)	topetinho-verde	FG	5,45	rara no local		Ne	E															
<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho	V	5,45	rara no local		Ne	F															
<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta	F	63,27	frequente		Ne	D,E,F	MA														
<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	F	3,64	rara no local		Ne	D,E	MA														
<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	F	56,36	comum		Ne	E,F															
Trogoniformes																						
Trogonidae																						
<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	surucuá-variado	FG	10,20	ocasional		On	D	MA														
Coraciiformes																						
Alcedinidae																						
<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	V	40,00	ocasional		Pi	A															

Nome do Taxon	Nome em Português	Registro	FO (%)	Status	Migração	Dieta	Ambiente	End.	Período													
									jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun		
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	F	25,45	ocasional		Pi	A,C		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno	F	1,82	rara no local		Pi	A		■													
Piciformes																						
Ramphastidae																						
<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766	tucano-de-bico-verde	FG	5,45	rara no local		On	D,E	MA						■						■		■
Picidae																						
<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	picapauzinho-de-coleira	F	81,82	muito comum		In	D,E	MA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	pica-pau-branco	F	25,45	ocasional		In	D,E,F															
<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	picapauzinho-verde-carijó	FG	36,73	ocasional		In	D,E	MA	■		■											
<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado	F	74,55	ocasional		In	E,F															
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	F	12,73	frequente		In	E															
<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	F	78,18	frequente		In	D,E															
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	FG	23,64	ocasional		In	D,E															
Falconiformes																						
Falconidae																						
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	carcará	F	67,27	frequente		On	B,C,D,E,F		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	FG	41,82	comum		Ca	B,C,D,E,F		■													

Nome do Táxon	Nome em Português	Registro	FO (%)	Status	Migração	Dieta	Ambiente	End.	Período															
									jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun				
<i>Micrastur</i> <i>ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé	G	8,16	rara no local		Ca	D																	
<i>Micrastur</i> <i>semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	falcão-relógio	G	8,16	rara no local		Ca	D																	
<i>Falco</i> <i>sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	V	3,64	rara no local		Ca	D,E,F																	
<i>Falco</i> <i>peregrinus</i> Tunstall, 1771	falcão-peregrino	V	3,64	rara no local	Mi	Ca	D,E																	
Psittaciformes																								
Psittacidae																								
<i>Pyrrhura</i> <i>frontalis</i> (Vieillot, 1817)	tiriba	F	54,55	comum		Fr	D,E	MA																
<i>Forpus</i> <i>xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	VA	12,73	ocasional		Fr	E																	
<i>Brotogeris</i> <i>tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	F	41,82	comum		Fr	E	MA																
<i>Pionopsitta</i> <i>pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú	A	2,04	rara no local		Fr	D																	
<i>Amazona</i> <i>aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio	VA	16,36	ocasional		Fr	D,E																	
Passeriformes																								
Thamnophilidae																								
<i>Dysithamnus</i> <i>mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa	FG	83,67	muito comum		In	D																	
<i>Pyriglena</i> <i>leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	FG	89,80	muito comum		In	D	MA																
<i>Myrmoderus</i> <i>squamosus</i> (Pelzeln, 1868)	papa-formiga-de-grota	FG	79,59	frequente		In	D	MA																
Conopophagidae																								

Nome do Táxon	Nome em Português	Registro	FO (%)	Status	Migração	Dieta	Ambiente	End.	Período													
									jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun		
<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	chupa-dente	FG	8,16	rara no local		In	D	MA														
Rhinocryptidae																						
<i>Eleoscytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831)	macuquinho	FG	75,51	frequente		In	D	MA														
Dendrocolaptidae																						
<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	F	26,53	ocasional		In	D	MA														
Furnariidae																						
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	F	98,18	muito comum		In	B,E,F															
<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	FG	95,92	muito comum		In	D	MA														
<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	joão-teneném	VG	56,36	comum		In	C,D,E,F															
<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	FG	60,00	comum		In	D,E	MA														
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié	FG	41,82	comum		In	C															
<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)	joão-botina-do-brejo	G	58,18	comum		In	C	MA														
<i>Anumbius annumbi</i> (Vieillot, 1817)	cochicho	F	5,45	rara no local		In	F															
<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	FG	53,06	comum		In	D	MA														
<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca	FG	34,69	ocasional		In	C,D															
Xenopidae																						
<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)	bico-virado-miúdo	F	46,94	comum		In	D															

Nome do Táxon	Nome em Português	Registro	FO (%)	Status	Migração	Dieta	Ambiente	End.	Período													
									jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun		
Pipridae																						
<i>Chiroxiptia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	tangará	FG	44,90	comum		Fr	D	MA														
Tityridae																						
<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim	FG	14,29	ocasional		Fr	D	MA														
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	FG	26,53	ocasional	Mp	On	D															
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto	FG	36,36	ocasional	Mp	On	D,E,F															
Cotingidae																						
<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	G	4,08	rara no local		Fr	D	MA														
<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó	V	10,20	ocasional		Fr	D	MA														
Platyrrinchidae																						
<i>Platyrrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	patinho	FG	61,22	frequente		In	D															
Rhynchocyclidae																						
<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846	abre-asa-de-cabeça-cinza	F	8,16	rara no local		In	D,E	MA														
<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831)	tiririzinho-do-mato	AV	4,08	rara no local		In	D	MA														
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo	F	63,27	frequente		In	D															
<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho	V	2,04	rara no local		In	D	MA														
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó	FG	63,27	frequente		In	C,D															

Nome do Taxon	Nome em Português	Registro	FO (%)	Status	Migração	Dieta	Ambiente	End.	Período													
									jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun		
<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	V	5,45	rara no local		In	E															
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	FG	85,71	muito comum		In	D															
Tyrannidae																						
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	FG	45,45	comum		On	E															
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	tuque-pium	FG	21,82	ocasional	Mp	On	E,F															
<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque	VA	1,82	rara no local		On	E															
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	FG	87,27	muito comum		In	D,E															
<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho	F	5,45	rara no local		In	E															
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe	FG	10,91	ocasional	Mp	In	C															
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	FG	53,06	comum	Mp	In	D															
<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno	F	16,36	ocasional		In	E															
<i>Xolmis cinereus</i> (Vieillot, 1816)	primavera	V	1,82	rara no local		In	F															
<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada	F	61,82	frequente		In	C,E,F															
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	F	85,45	muito comum		In	C,F															
<i>Legatus leucophaius</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	FG	6,12	rara no local	Mp	In	D															
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	F	16,36	ocasional		On	E															

Nome do Táxon	Nome em Português	Registro	FO (%)	Status	Migração	Dieta	Ambiente	End.	Período											
									jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	F	100,00	muito comum	Mp	On	B,C,D,E,F													
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Stattus Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado	FG	43,64	comum	Mp	On	D,E													
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei	FG	29,09	ocasional		On	D,E													
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	F	30,91	ocasional	Mp	In	D,E													
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	FG	63,64	frequente	Mp	In	D,E,F													
<i>Tyrannus savana</i> Daudin, 1802	tesourinha	F	43,64	comum	Mp	In	E,F													
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irré	FG	36,73	ocasional	Mp	On	D													
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira	F	3,64	rara no local		On	E,F													
Vireonidae																				
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	FG	96,36	muito comum		On	D,E													
<i>Vireo chivi</i> (Linnaeus, 1766)	juruvicara	FG	58,18	comum	Mp	On	D,E													
Hirundinidae																				
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	F	89,09	muito comum		In	A,B,C,D,E,F													
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora	F	10,91	ocasional	Mp	In	D,E,F													
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo	V	10,91	ocasional	Mp	In	E,F													
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-grande	F	7,27	rara no local	Mp	In	E													

Nome do Táxon	Nome em Português	Registro	FO (%)	Status	Migração	Dieta	Ambiente	End.	Período													
									jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun		
<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco	V	16,36	ocasional		In	A,F															
Troglodytidae																						
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	FG	98,18	muito comum		In	B,E,F															
Turdidae																						
<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	FG	78,18	frequente		On	B,D,E,F															
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-branco	FG	85,45	muito comum		On	B,E,F															
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	FG	83,64	muito comum	Mp	On	B,E,F															
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	FG	63,27	frequente		On	D															
Mimidae																						
<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	FG	70,91	frequente		On	B,E,F															
Motacillidae																						
<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	caminheiro-zumbidor	F	67,27	frequente		In	F															
Passerellidae																						
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	FG	92,73	muito comum		Gr	B,E,F															
Parulidae																						
<i>Setophaga pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	FG	76,36	frequente		In	D,E															
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	FG	58,18	comum		In	C,F															
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	FG	95,92	muito comum		In	D,E															

Nome do Taxon	Nome em Português	Registro	FO (%)	Status	Migração	Dieta	Ambiente	End.	Período													
									jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun		
<i>Myiothlypis leucoblephara</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	A	16,33	ocasional		In	D	MA	■													
Icteridae																						
<i>Icterus pyrrhopterus</i> (Vieillot, 1819)	encontro	F	10,91	ocasional		Ne	E		■	■				■								
<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldi	VG	1,82	rara no local		On	C															■
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chupim	F	49,09	comum		On	E,F		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Thraupidae																						
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva	V	5,45	rara no local		In	D,E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Tangara sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaço-cinzento	F	98,18	muito comum		Fr	E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Tangara palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaço-do-coqueiro	F	32,73	ocasional		Fr	E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	V	3,64	rara no local		Fr	E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	FG	65,45	frequente		In	D,E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra	F	89,09	muito comum		Gr	B,E,F		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	cigarra-bambu	F	4,08	rara no local		Gr	D	MA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	F	5,45	rara no local		Gr	F		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	F	59,18	comum		On	D		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	FG	81,63	muito comum		Fr	C,D,E	MA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Nome do Taxon	Nome em Português	Registro	FO (%)	Status	Migração	Dieta	Ambiente	End.	Período												
									jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	F	25,45	ocasional		Fr	E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	F	78,18	frequente		Ne	D,E,F		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho	F	20,00	ocasional	Mp	Gr	F														
<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	pioxó	A	4,08	rara no local		Gr	D	MA													
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	F	9,09	rara no local	Mp	Gr	F		■												
<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro	VG	18,37	ocasional		On	C,D														
<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	F	23,64	ocasional		In	E		■												
Cardinalidae																					
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-de-bando	FG	75,51	frequente		In	D		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fringillidae																					
<i>Spinus magellanicus</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo	FG	16,36	ocasional		Gr	E,F		■	■											
Estrildidae																					
<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	F	5,45	rara no local		Gr	F													■	■
Passeridae																					
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	V	1,81	rara no local		On	F		■												

Tabela S2. Espécies exóticas de provável escape ou soltura de cativeiro registradas no Solo Sagrado do Guarapiranga.

Table S2. Exotic species likely to escape captivity registered in Solo Sagrado do Guarapiranga.

Nome do Táxon	Nome em Português	Registro
Anseriformes Linnaeus, 1758		
Anatidae Leach, 1820		
<i>Alopochen aegyptiacus</i> (Linnaeus 1766)	ganso-do-egito	F
Columbiformes Latham, 1790		
Columbidae Leach, 1820		
<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	rola-de-colar-europeia	F
Passeriformes Linné, 1758		
Fringillidae Leach, 1820		
<i>Serinus canaria</i> (Linnaeus, 1758)	canário-do-reino	F
Estrildidae Bonaparte, 1850		
<i>Taeniopygia guttata</i> (Vieillot, 1817)	mandarim	F