

**BIRD ASSEMBLAGES AT THE SOUTHERN LIMIT OF THE BRAZILIAN
ATLANTIC FOREST: A COMPARISON BETWEEN TWO FOREST
PHYSIOGNOMIES AT THE APARADOS DA SERRA NATIONAL PARK**

Danielle Franco^{1*} & Maria João Ramos Pereira^{1,2}

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Zoologia, Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Av. Bento Gonçalves, 9500, CEP 91540-000, Porto Alegre, RS, , Brazil.

² Universidade de Aveiro, Campus Universitário de Santiago, Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, 3810-193, Aveiro, Portugal.

E-mails: danielle.franco12@gmail.com (*corresponding author); mjrayka@gmail.com

Supplementary Material 1. Location of sampling points in the Aparados da Serra National Park, Cambará do Sul (RS) and Praia Grande (SC) municipalities, Brazil.

Sampling point	Forest formation	Altitude (m)	Coordinates	
FLOM1	<i>Araucaria</i> forest	922	29°09'52.5" S	50°05'48.2" W
FLOM2	<i>Araucaria</i> forest	923	29°10'23.6" S	50°06'00.0" W
FLOM3	<i>Araucaria</i> forest	1020	29°10'19.14" S	50°06'59.54" W
FLOD1	Ombrophilous dense forest	100	29°12'04.3" S	50°02'48.3" W
FLOD2	Ombrophilous dense forest	279	29°12'22.69" S	50°03'10.60" W
FLOD3	Ombrophilous dense forest	260	29°12'20.20" S	50°03'51.00" W