

PEIXES NÃO-NATIVOS EM RIACHOS NO BRASIL: ESTADO DA ARTE, LACUNAS DE CONHECIMENTO E PERSPECTIVAS

Diego Azevedo Zoccal Garcia^{1}, Fernando Mayer Pelicice², Marcelo Fulgêncio Guedes de Brito³, Mário Luís Orsi¹ & André Lincoln Barroso de Magalhães⁴*

Material Supplementar

Tabela S1. Lista de estudos utilizados a partir de levantamento em literatura.

Bacia do rio Paranaíba	Araújo, N. B., & Tejerina-Garro, F. L. 2007. Composição e diversidade da ictiofauna em riachos do Cerrado, bacia do ribeirão Ouvidor, alto rio Paraná, Goiás, Brasil. <i>Revista Brasileira de Zoologia</i> , 24(4), 981–990. Araújo, N. B., & Tejerina-Garro, F. L. 2008. Influence of environmental variables and anthropogenic perturbations on stream fish assemblages, Upper Paraná River, Central Brazil. <i>Neotropical Ichthyology</i> , 7(1), 31–38. Carvalho, D. R., Castro, D. Callisto, M. Moreira, M. Z., & Pompeu, P. S. 2015. Isotopic variation in five species of stream fishes under the influence of different land uses. <i>Journal of Fish Biology</i> , 87(3), 559–578. DOI: 10.1111/jfb.12734 Carvalho, D. R., Castro, D. M. P., Callisto, M., Moreira, M. Z., & Pompeu, P. S. 2017. The trophic structure of fish communities from streams in the Brazilian Cerrado under different land uses: an approach using stable isotopes. <i>Hydrobiologia</i> , 795, 199–217. DOI: 10.1007/s10750-017-3130-6 Carvalho, D. R., Castro, D. M. P., Callisto, M., Chaves, A. J. M., Moreira, M. Z., & Pompeu, P. S. 2019. Stable isotopes and stomach content analyses indicate omnivorous habits and opportunistic feeding behavior of an invasive fish. <i>Aquatic Ecology</i> , 53, 365–381. DOI: 10.1007/s10452-019-09695-3 Couto, T. B. A., & Aquino, P. P. U. 2011. Structure and integrity of fish assemblages in streams associated to conservation units in Central Brazil. <i>Neotropical Ichthyology</i> , 9(2), 445-454. DOI: 10.1590/S1679-62252011000200023 Fagundes, D. C., Leal, C. G., Carvalho, D. R., Junqueira, N. T., Langeani, F., & Pompeu. P. S. 2015. The stream fish fauna from three regions of the Upper Paraná River basin. <i>Biota Neotropica</i> , 15(2), e20140187. DOI: 10.1590/1676-06032015018714 Fialho, A. P., Oliveira, L. G., Tejerina-Garro, F. L., & Gomes, L. C. 2007. Fish assemblage structure in tributaries of the Meia Ponte
-------------------------------	--

- River, Goiás, Brazil. *Neotropical Ichthyology*, 5(1), 53–60.
- Fialho, A. P., Oliveira, L. G., Tejerina-Garro, F. L., & Mérona, B. 2008. Fish-habitat relationship in a tropical river under anthropogenic influences. *Hydrobiologia*, 598, 315–324. DOI: 10.1007/s10750-007-9165-3
- Penczak, T., Agostinho, A. A., Gomes, L. C., & Latini, J. D. 2009. Impacts of a reservoir on fish assemblages of small tributaries of the Corumbá River, Brazil. *River Research and Applications*, 25, 1013–1024. DOI: 10.1002/rra.1200
-
- Bacia do rio Grande**
- Azevedo-Santos, V. M., Coelho, P. N., & Deprá, G. C. 2018. Ichthyofauna of the Ribeirão Frutal and tributaries, upper Rio Paraná basin, Minas Gerais, Southeastern Brazil. *Biota Neotropica*, 18(3), e20180517. DOI: 10.1590/1676-0611-BN-2018-0517
- Azevedo-Santos, V. M., Britski, H. A., Oliveira, C., & Benine, R. C. 2019. Ichthyofauna of streams of the Rio Sapucaí basin, upper Rio Paraná system, Minas Gerais, Brazil. *Biota Neotropica*, 19(1), e20180617. DOI: 10.1590/1676-0611-BN-2018-0617
- Casatti, L., Langeani, F., & Ferreira, C. P. 2006. Effects of physical habitat degradation on the stream fish assemblage structure in a pasture region. *Environmental Management*, 38, 974–982. DOI: 10.1007/s00267-005-0212-4
- Casatti, L., Ferreira, C. P., & Langeani, F. 2009a. A fish-based biotic integrity index for assessment of lowland streams in southeastern Brazil. *Hydrobiologia*, 623, 173–189. DOI: 10.1007/s10750-008-9656-x
- Casatti, L., Ferreira, C. P., & Carvalho F. R. 2009b. Grass-dominated stream sites exhibit low fish species diversity and dominance by guppies: an assessment of two tropical pasture river basins. *Hydrobiologia*, 632, 273–283. DOI: 10.1007/s10750-009-9849-y
- Castro, R. M. C., Casatti, L., Santos, H. F., Melo, A. L. A., Martins, L. S. F., Ferreira, K. M., Gibran, F. Z., Benine, R. C., Carvalho, M., Ribeiro, A. C., Abreu, T. X., Bockmann, F. A., Pelição, G. Z., Stopiglia, R., & Langeani, F. 2004. Estrutura e composição da ictiofauna de riachos da bacia do rio Grande no estado de São Paulo, Sudeste do Brasil. *Biota Neotropica*, 4(1), 1–39.
- Magalhães, A. L. B., Andrade, R. F., Ratton, T. F., & Brito, M. F. G. 2002. Ocorrência da truta arco-íris *Oncorhynchus mykiss* (Walbaum, 1792) (Pisces: Salmonidae) no alto rio Aiuruóca e tributários, bacia do rio Grande, Minas Gerais, Brasil. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão*, 14, 33–40.
- Rocha, F. C., Casatti, L., Carvalho, F. R., & Silva, A. M. 2009a. Fish assemblages in stream stretches occupied by cattail (Typhaceae, Angiospermae) stands in Southeast Brazil. *Neotropical Ichthyology*, 7(2), 241–250.
- Rocha, F. C., Casatti, L., & Pereira, D. C. 2009b. Structure and feeding of a stream fish assemblage in Southeastern Brazil: evidence of low seasonal influences. *Acta Limnologica Brasiliensis*, 21(1), 123–134.
-
- Bacia do rio Tietê**
- Alexandre, C. V., Esteves, K. E., & Moura e Mello, M. A. M. 2010. Analysis of fish communities along a rural–urban gradient in a neotropical stream (Piracicaba River Basin, São Paulo, Brazil). *Hydrobiologia*, 641, 97–114. DOI: 10.1007/s10750-009-0060-y
- Cardoso, R. T., Oliveira, A. K., & Garavello, J. C. 2016. Longitudinal distribution of the ichthyofauna in a tributary of Tietê River with sources on the Basaltic Cuestas of São Paulo, Southeastern Brazil. *Biota Neotropica*, 16(2), e20150005. DOI: 10.1590/1676-0611-BN-2015-0005
- Carmassi, A. L., Rondineli, G. R., & Braga, F.M. S. 2009. Fish, Passa Cinco stream, Corumbataí river basin, state of São Paulo, Brazil. *Check List*, 5(1), 112–117. DOI: 10.15560/5.1.112
- Ferreira, F. C., & Petrere Jr., M. 2007. Anthropic effects on the fish community of Ribeirão Claro, Rio Claro, SP, Brazil. *Brazilian Journal of Biology*, 67(1), 23–32. DOI: 10.1590/S1519-69842007000100004
- Langeani, F., Casatti, L., Gameiro, H. S., Carmo, A. B., & Rossa-Feres, D. C. 2005. Riffle and pool fish communities in a large stream of southeastern Brazil. *Neotropical Ichthyology*, 3(2), 305–311. DOI: 10.1590/S1679-62252005000200009
- Oliveira, A. K., & Garavello, J. C. 2003. Fish assemblage composition in a tributary of the Mogi Guaçu River basin, Southeastern Brazil. *Iheringia, Série Zoologia*, 93(2), 127–138. DOI: 10.1590/S0073-47212003000200002

- Oliveira, A. K., Apone, F., Birindelli, J. L. O., & Garavello, J. C. 2013. Fish assemblage structure of the Ipanema River, a small lotic environment partially protected by a Conservation Unit in southeastern Brazil. *Brazilian Journal of Biology*, 73(2), 259–270. DOI: 10.1590/S1519-69842013000200006
- Pazian, M. F., Leal, H. M. M., & Laluccce, M. 2011. Ichthyofaunal survey of the Riacho Goulart, tributary of the Tietê River (upper Paraná basin). *Check List*, 7(5), 652–655. DOI: 10.15560/7.5.652
- Rolla, A. P. P. R., Esteves, K. E., & Ávila-da-Silva, A. O. 2009. Feeding ecology of a stream fish assemblage in an Atlantic Forest remnant (Serra do Japi, SP, Brazil). *Neotropical Ichthyology*, 7(1), 65–76. DOI: 10.1590/S1679-62252009000100009
- Santos, F. B., Ferreira, F. C., & Esteves, K. E. 2015. Assessing the importance of the riparian zone for stream fish communities in a sugarcane dominated landscape (Piracicaba River Basin, Southeast Brazil). *Environmental Biology of Fishes*, 98, 1895–1912 DOI: 10.1007/s10641-015-0406-4
- Shibatta, O. A., & Silva-Souza, Â. T. 2008. Fish, Ribeirão do Feijão Basin, São Carlos, São Paulo, Brazil. *Check List*, 4(1), 75–78. DOI: 10.15560/4.1.75
- Smith, W. S., Petrere Jr., Miguel, & Barrella, W. 2003. The fish fauna in tropical rivers: the case of the Sorocaba river basin, SP, Brazil. *Revista de Biología Tropical*, 51(3–4).
- Smith, W. S., Petrere Jr., M., & Barrella, W. 2009. The fish community of the Sorocaba River Basin in different habitats (State of São Paulo, Brazil). *Brazilian Journal of Biology*, 69(4), 1015–1025. DOI: 10.1590/S1519-69842009000500005
- Smith, W. S., Biagioni, R. C., & Halcsik, L. 2013. Fish fauna of Floresta Nacional de Ipanema, São Paulo State, Brazil. *Biota Neotropica*, 13(2), 175–181. DOI: 10.1590/S1676-06032013000200016
- Teresa, F. B., & Casatti, L. 2010. Importância da vegetação ripária em região intensamente desmatada no sudeste do Brasil: um estudo com peixes de riacho. *Pan-American Journal of Aquatic Sciences*, 5(3), 444–453.
- Yoshida, Claudia Eiko et al. 2016. Identification key of stream fishes of the Serra do Japi (Jundiaí-Cabreúva/SP Conservation Units). *Boletim do Instituto de Pesca*, 42(4), 800–815. DOI: 10.20950/1678-2305.2016v42n4p801

Bacia do rio Paranapanema

- Bonato, K. O., Delariva, R. L., & Silva, J. C. 2012. Diet and trophic guilds of fish assemblages in two streams with different anthropic impacts in the northwest of Paraná, Brazil. *Zoologia*, 29(1), 27–38. DOI: 10.1590/S1984-46702012000100004
- Casatti, L. 2004. Ichthyofauna of two streams (silted and reference) in the upper Paraná River basin, Southeastern Brazil. *Brazilian Journal of Biology*, 64(4), 757–765.
- Castro, R. M. C., Casatti, L., Santos, H. F., Ferreira, K. M., Ribeiro, A. C., Benine, R. C., Dardis, G. Z. P., Melo, A. L. A., Stopiglia, R., Abreu, T. X., Bockmann, F. A., Carvalho, M., Gibran, F. Z., & Lima, F. C. T. 2003. Estrutura e composição da ictiofauna de riachos do rio Paranapanema, Sudeste e Sul do Brasil. *Biota Neotropica*, 3(1), 1–31. DOI: 10.1590/S1676-06032003000100007
- Cerqueira, V. L. A., Carvalho, M. P., Almeida, R. S., Ferreira, F. C., Cetra, M., & Smith, W. S. 2016. Stream fish fauna from the tributaries of the upper Itapetininga River, upper Paranapanema River basin, state of São Paulo, Brazil. *Check List*, 12(2), 1879. DOI: 10.15560/12.2.1879
- Cetra, M., Mattox, G. M. T., Ferreira, F. C., Guinato, R. B., Silva, F. V., & Pedrosa, M. 2016. Headwater stream fish fauna from the Upper Paranapanema River basin. *Biota Neotropica*, 16(3), e20150145. DOI: 10.1590/1676-0611-BN-2015-0145
- Claro-García, A., Assega, F. M., & Shibatta, O. A. 2018. Diversity and distribution of ichthyofauna in streams of the middle and lower Tibagi river basin, Paraná, Brazil. *Check List*, 14(1), 43–53, DOI: 10.15560/114.1.43
- Costa, A. D. A., Ferreira, D. G., Silva, W. F., Zanatta, A. S., Shibatta, O. A., & Galindo, B. A. (2013). Fishes (Osteichthyes: Actinopterygii) from the Penacho stream, upper Paraná River basin, Paraná State, Brazil. *Check List*, 9(3), 519–523. DOI:

10.15560/9.3.519

- Garcia, D. A., & Benedito, E. 2010. Variation in energy density of *Loricariichthys platypteron* (Siluriformes: Loricariidae) in the upper Paraná River basin. *Neotropical Ichthyology*, 8(2), 321–327. DOI: 10.1590/S1679-62252010000200010
- Garcia, D. A. Z., Costa, A. D. A., Leme, G. L. A., & Orsi, M. L. 2014. Biology of black bass *Micropterus salmoides* (Lacepède, 1802) fifty years after the introduction in a small drainage of the Upper Paraná River basin, Brazil. *Biodiversitas*, 15(2), 180–185. DOI: 10.13057/biodiv/d150209
- Hoffmann, A. C., Nascimento, R. H. C., & Shibatta, O. A. 2015. Fish fauna from tributaries throughout the Tibagi River basin, upper Paraná basin, Brazil. *Check List*, 11(6), 1815. DOI: 10.15560/11.6.1815

Bacia do rio Paraíba do Sul

- Braga, F. M. S., & Andrade, P. M. 2005. Distribuição de peixes na microbacia do Ribeirão Grande, Serra da Mantiqueira Oriental, São Paulo, Brasil. *Iheringia, Série Zoologia*, 95(2), 121–126. DOI: 10.1590/S0073-47212005000200002.
- Braga, F. M. S., Carmassi, A. L., Rondineli, G., & Lourenço, J. M. R. M. F. 2014. Fish distribution in watersheds of the eastern part of the Serra da Mantiqueira (state of São Paulo). *Brazilian Journal of Biology*, 74(2), 302–310. DOI: 10.1590/1519-6984.14812
- Brito, V., & Buckup, P. A. 2019. The fish fauna of the upper Piráí drainage, a transposed mountain river system in southeastern, Brazil. *Check List*, 15(1), 235–247. DOI: 10.15560/15.1.235
- Magalhães, A. L. B., Amaral, I. B., Ratton, T. F., & Brito, M. F. G. 2002. Ornamental exotic fishes in the Glória Reservoir and Boa Vista Stream, Paraíba do Sul River basin, State of Minas Gerais, Southeastern Brazil. *Comunicações do Museu de Ciências e Tecnologia, Série Zoologia*, 15(2), 265–278
- Magalhães, A. L. B. 2007. Novos registros de peixes exóticos para o Estado de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia*, 24(1), 250–252. DOI: 10.1590/S0101-81752007000100034
- Magalhães, A. L. B., & Carvalho, P. A. 2007. Occurrence of exotic ornamental fish in streams in the states of Minas Gerais and Rio de Janeiro, Brazil. *Natureza & Conservação*, 5(2), 124–129.
- Magalhães, A. L. B., & Jacobi, C. M. 2008. Ornamental exotic fish introduced into Atlantic Forest water bodies, Brazil. *Neotropical Biology and Conservation*, 3(2), 73–77.
- Magalhães, A. L. B., & Jacobi, C. M. 2013. Asian aquarium fishes in a Neotropical biodiversity hotspot: impeding establishment, spread and impacts. *Biological Invasions*, 15, 2157–2163. DOI: 10.1007/s10530-013-0443-x
- Magalhães, A. L. B., & Jacobi, C. M. 2016. Polo de piscicultura ornamental de Muriaé, Minas Gerais: importante fonte de peixes introduzidos no Brasil. In: Latini, A. O., Resende, D. C., Pombo, V. B., & Coradin, L. (Eds.). *Espécies exóticas invasoras de águas continentais no Brasil*. Ministério do Meio Ambiente, Brasília, 600–618.
- Magalhães, A. L. B., & Jacobi, C. M. 2017. Colorful invasion in permissive Neotropical ecosystems: establishment of ornamental non-native poeciliids of the genera *Poecilia*/*Xiphophorus* (Cyprinodontiformes: Poeciliidae) and management alternatives. *Neotropical Ichthyology*, 15(1), e160094. DOI: 10.1590/1982-0224-20160094
- Magalhães, A. L. B., Brito, M. F. G., & Sarrouh, B. 2019. An inconvenient routine: introduction, establishment and spread of new non-native fishes in the Paraíba do Sul River basin, state of Minas Gerais, Brazil. *Neotropical Biology and Conservation*, 14(3), 329–338. DOI: 10.3897/neotropical.14.e38058
- Magalhães, A. L. B., Daga, V. S., Bezerra, L. A. V., Vitule, J. R. S., Jacobi, C. M., & Silva, L. G. M. 2020. All the colors of the world: biotic homogenization-differentiation dynamics of freshwater fish communities on demand of the Brazilian aquarium trade. *Hydrobiologia*, 1–19. DOI: 10.1007/s10750-020-04307-w
- Rondineli, G., Carmassi, A. L., & Braga, F. M. S. 2011. Pisces, Buenos and Guaratinguetá watersheds, eastern Serra da Mantiqueira, São

Paulo, Brazil. Check List, 7(1), 71–74. DOI: 10.15560/7.1.71

Salgado, F. L. K., Terra, B. F., Camilo, G. S., Silva, E. O., & Araújo, F. G. 2015. Occurrence of *Pseudocorynopoma heterandria* Eigenmann, 1914 (Characidae) in Paraíba do Sul River Basin (Southeastern Brazil). Journal of Applied Ichthyology, 31(2), 390–392. DOI: 10.1111/jai.12657
