

Fitodiversidade dos Gramados do Campus do Vale da UFRGS

**GRAMADOS URBANOS: A SURPREENDENTE DIVERSIDADE DE
ESPÉCIES ENCONTRADA NO CAMPUS DO VALE DA UFRGS (RS,
BRASIL) E SUAS POTENCIALIDADES**

Mateus Henrique Schenkel^{1}, Ana Boeira Porto¹ & Gerhard Ernst Overbeck¹*

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Biociências, Departamento de Botânica, Laboratório de Estudos em Vegetação Campestre, Av. Bento Gonçalves, 9500, prédio 43433, CEP 91501-970, Porto Alegre, RS, Brasil.

E-mails: mateus.h.schenkel@gmail.com (*corresponding author); aanaporto@gmail.com; gerhard.overbeck@ufrgs.br

Material Suplementar

Material Suplementar 1. Lista de espécies encontradas durante os levantamentos florísticos dos gramados do Campus do Vale, Porto Alegre, RS, Brasil. As espécies em negrito são encontradas nos campos dos morros graníticos de Porto Alegre; espécies acompanhadas por (*) são nativas, porém não constam na lista da flora dos morros de Porto Alegre (Setubal *et al.* 2011).

Supplementary Material 1. List of species found during vegetation sampling of the lawns of Campus do Vale, Porto Alegre, RS, Brazil. The species in bold are found in the fields of the granite hills of Porto Alegre; species accompanied by (*) are native, but are not included in the list of flora of the hills of Porto Alegre (Setubal *et al.* 2011).

| FAMÍLIA | ESPÉCIE | NOME COMUM | ORIGEM | FORMA DE VIDA | FR | CR | IVI |
|---------------|--|---|--------|------------------|-------|--------|-------|
| Amaranthaceae | <i>Pfaffia tuberosa</i> (Spreng.) Hicken | Corango-de-batata | Nativa | Erva lignificada | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Anacardiaceae | * <i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi | Aroeira-vermelha | Nativa | Árvore | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Apiaceae | <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb. | Centelha-asiática | Nativa | Estolonífera | 0,013 | 0,0153 | 0,014 |
| Apiaceae | <i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson | Aipo-bravo | Nativa | Terófito | 0,013 | 0,0028 | 0,008 |
| Apiaceae | <i>Eryngium elegans</i> Cham. & Schtdl. | Elegante, gravatá | Nativa | Rosetada | 0,039 | 0,1629 | 0,101 |
| Apiaceae | <i>Eryngium horridum</i> Malme | Gravatá | Nativa | Rosetada | 0,007 | 0,0060 | 0,006 |
| Araliaceae | <i>Hydrocotyle bonariensis</i> Lam. | Erva-capitão, acariçoba, chapéu-de-cobra. | Nativa | Estolonífera | 0,002 | 0,0019 | 0,002 |
| Araliaceae | <i>Hydrocotyle exígua</i> (Urb.) Malme | Erva-capitão-miúda | Nativa | Estolonífera | 0,035 | 0,0204 | 0,028 |
| Asteraceae | <i>Aspilia montevidensis</i> Spreng.) Kuntze | Mal-me-quer-do-campo | Nativa | Decumbente | 0,007 | 0,0019 | 0,004 |
| Asteraceae | <i>Campuloclinium macrocephalum</i> (Less.) DC. | Erva-pom-pom, eupatório-roxo | Nativa | Erva | 0,004 | 0,0014 | 0,003 |
| Asteraceae | <i>Chaptalia integerrima</i> (Vell.) Burkart | Língua-de-vaca | Nativa | Rosetada | 0,004 | 0,0009 | 0,003 |
| Asteraceae | <i>Chaptalia nutans</i> (L.) Pol. | Língua-de-vaca, arnica-do-campo | Nativa | Rosetada | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Asteraceae | <i>Chevreulia sarmentosa</i> (Pers.) Blake | Cabelo-de-anjo | Nativa | Terófito | 0,013 | 0,0217 | 0,017 |
| Asteraceae | <i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist | Buva | Nativa | Terófito | 0,007 | 0,0014 | 0,004 |
| Asteraceae | * <i>Conyza canadenses</i> (L.) Cronquist | Buva | Nativa | Terófito | 0,004 | 0,0014 | 0,003 |
| Asteraceae | <i>Conyza primulifolia</i> (Lam.) Cuatrec. & Lourteig | - | Nativa | Rosetada | 0,022 | 0,0056 | 0,014 |
| Asteraceae | <i>Eclipta prostrata</i> (L.) L. | Erva-botão | Nativa | Erva lignificada | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |

| FAMÍLIA | ESPÉCIE | NOME COMUM | ORIGEM | FORMA DE VIDA | FR | CR | IVI |
|-----------------|---|---|--------------|------------------|-------|--------|-------|
| Asteraceae | <i>Elephantopus mollis</i> Kunth | Pé-de-elefante | Nativa | Erva lignificada | 0,015 | 0,0083 | 0,012 |
| Asteraceae | <i>Facelis retusa</i> (Lam.) Sch.Bip. | Macelinha | Nativa | Terófito | 0,018 | 0,0037 | 0,011 |
| Asteraceae | <i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd. | Macelinha, vira-vira | Nativa | Rosetada | 0,013 | 0,0032 | 0,008 |
| Asteraceae | <i>Gamochaeta simplicicaulis</i> (Willd. ex Spreng.) Cabrera | Macelinha | Nativa | Rosetada | 0,013 | 0,0028 | 0,008 |
| Asteraceae | <i>Hypochaeris albiflora</i> (Kuntze) Azevêdo-Gonç. & Matzenb. | - | Nativa | Rosetada | 0,011 | 0,0028 | 0,007 |
| Asteraceae | <i>Hypochaeris chillensis</i> (Kunth) Britton | Almeirão-do-campo | Nativa | Rosetada | 0,004 | 0,0014 | 0,003 |
| Asteraceae | <i>Hypochaeris megapotamica</i> Cabrera | Almeirão-do-campo, almeirão, almeirãozinho | Nativa | Rosetada | 0,009 | 0,0023 | 0,006 |
| Asteraceae | <i>Hypochaeris radicata</i> L. | Almeirão-do-campo, almeirão-de- roseta | Naturalizada | Rosetada | 0,013 | 0,0699 | 0,042 |
| Asteraceae | <i>Orthopappus angustifolius</i> (Sw.) Gleason | Erva-grossa, língua-de-vaca | Nativa | Erva lignificada | 0,007 | 0,0069 | 0,007 |
| Asteraceae | <i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav. | Roseta | Nativa | Terófito | 0,026 | 0,0148 | 0,021 |
| Asteraceae | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill | Serralha | Naturalizada | Rosetada | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Asteraceae | <i>Chromolaena hirsuta</i> (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob. | Charrua, erva-de-charrua | Nativa | Erva lignificada | 0,002 | 0,0019 | 0,002 |
| Asteraceae | <i>Youngia Japonica</i> (L.) DC. | Crepe-do-japão, barba-de-falcão | Naturalizada | Rosetada | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Caryophyllaceae | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill. | Orelha-de-rato | Naturalizada | Terófito | 0,011 | 0,0023 | 0,007 |
| Caryophyllaceae | <i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L. | Saboneteira | Naturalizada | Decumbente | 0,002 | 0,0009 | 0,002 |
| Caryophyllaceae | <i>Spergula arvensis</i> L. | Espérgula | Naturalizada | Erva | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Commelinaceae | <i>Commelina erecta</i> L. | Trapoeiraba, erva-de-santa-luzia | Nativa | Decumbente | 0,007 | 0,0028 | 0,005 |
| Convolvulaceae | <i>Dichondra sericea</i> Sw. | Dinheiro-em-penca, orelha-de- rato | Nativa | Estolonífero | 0,026 | 0,0495 | 0,038 |
| Convolvulaceae | <i>Evolvulus sericeus</i> Sw. | Glória-da-manhã, anê-prateada | Nativa | Decumbente | 0,004 | 0,0009 | 0,003 |
| Cyperaceae | <i>Carex phalaroides</i> Kunth | Tiririca | Nativa | Touceira | 0,015 | 0,0088 | 0,012 |

| FAMÍLIA | ESPÉCIE | NOME COMUM | ORIGEM | FORMA DE VIDA | FR | CR | IVI |
|--------------|--|--|--------------|------------------|-------|--------|-------|
| Cyperaceae | <i>Cyperus obtusatus</i> (J.Presl & C.Presl) Mattf. & Kük. | Tiririca | Nativa | Touceira | 0,022 | 0,0111 | 0,016 |
| Cyperaceae | * <i>Cyperus sp.</i> | Tiririca | Nativa | Touceira | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Cyperaceae | <i>Rhynchospora tenuis</i> Link | - | Nativa | Touceira | 0,007 | 0,0032 | 0,005 |
| Fabaceae | <i>Desmodium incanum</i> (Sw.) DC. | Pega-pega | Naturalizada | Erva lignificada | 0,050 | 0,0444 | 0,047 |
| Fabaceae | <i>Medicago lupulina</i> L. | Luzerna-amarela, alfafa-de-flor-amarela, alfafa-lupulina | Naturalizada | Erva lignificada | 0,004 | 0,0056 | 0,005 |
| Fabaceae | <i>Medicago polymorpha</i> L. | Trevo-carretilha, alfafinha, trevo-rasteiro | Naturalizada | Erva lignificada | 0,002 | 0,0019 | 0,002 |
| Fabaceae | <i>Nanogalactia heterophylla</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) L.P.Queiroz | - | Nativa | Erva lignificada | 0,007 | 0,0014 | 0,004 |
| Fabaceae | <i>Stylosanthes leiocarpa</i> Vogel | Alfafa-do-campo | Nativa | Erva lignificada | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Fabaceae | * <i>Stylosanthes viscosa</i> (L.) Sw. | Alfafa-do-campo | Nativa | Erva lignificada | 0,002 | 0,0019 | 0,002 |
| Fabaceae | * <i>Zornia sp.</i> J.F.Gmel. | - | Nativa | Erva lignificada | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Gentianaceae | <i>Centaurium erythraea</i> Rafn. | Centáurea-menor, fél-da-terra | Naturalizada | Terófito | 0,007 | 0,0019 | 0,004 |
| Hypoxidaceae | <i>Hypoxis decumbens</i> L. | Viririca-de-flor-amarela, tiririca-brava, falsa-tiririca | Nativa | Geófito bulbosa | 0,028 | 0,0088 | 0,019 |
| Iridaceae | * <i>Herbertia lahue</i> (Molina) Goldblatt | Bibi, trindade | Nativa | Geófito bulbosa | 0,004 | 0,0009 | 0,003 |
| Iridaceae | <i>Sisyrinchium micranthum</i> Cav. | Cebolinha | Nativa | Terófito | 0,024 | 0,0051 | 0,015 |
| Juncaceae | <i>Juncus capillaceus</i> Lam. | Junco | Nativa | Touceira | 0,015 | 0,0037 | 0,010 |
| Juncaceae | * <i>Juncus pallescens</i> Lam. | Junco | Nativa | Touceira | 0,004 | 0,0009 | 0,003 |
| Juncaceae | <i>Juncus tenuis</i> Willd. | Junco | Nativa | Touceira | 0,009 | 0,0019 | 0,005 |
| Lythraceae | <i>Cuphea glutinosa</i> Cham. & Schltldl. | Sete-sangrias | Nativa | Erva lignificada | 0,009 | 0,0042 | 0,006 |
| Oxalidaceae | <i>Oxalis conorrhiza</i> Jacq. | Azedinha, trevo | Nativa | Geófito bulbosa | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Oxalidaceae | <i>Oxalis corniculata</i> L. | Azedinha, trevo | Naturalizada | Geófito bulbosa | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Oxalidaceae | <i>Oxalis sp.</i> | Azedinha, trevo | | Geófito bulbosa | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |

| FAMÍLIA | ESPÉCIE | NOME COMUM | ORIGEM | FORMA DE VIDA | FR | CR | IVI |
|----------------|--|--|--------------|---------------|-------|--------|-------|
| Plantaginaceae | <i>Mecardonia procumbens</i> (Mill.) Small | Bacopa-amarela | Nativa | decumbente | 0,009 | 0,0065 | 0,008 |
| Plantaginaceae | <i>Plantago myosuroides</i> Lam. | Tanchagem-miúda, tanchagem- rabo-de-gato | Nativa | Terófito | 0,013 | 0,0074 | 0,010 |
| Plantaginaceae | <i>Plantago tomentosa</i> Lam. | Tanchagem, tansagem | Nativa | Rosetada | 0,018 | 0,0106 | 0,014 |
| Plantaginaceae | <i>Veronica peregrina</i> L. | Verônica | Naturalizada | Terófito | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Poaceae | <i>Agrostis montevidensis</i> Spreng. ex Nees | Capim-mimoso | Nativa | Touceira | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Poaceae | <i>Andropogon lateralis</i> Nees | Capim-caninha | Nativa | Touceira | 0,018 | 0,0273 | 0,022 |
| Poaceae | <i>Aristida laevis</i> (Nees) Kunth | Barba-de-bode-alta | Nativa | Touceira | 0,002 | 0,0046 | 0,003 |
| Poaceae | <i>Axonopus affinis</i> Chase | Gramma-tapete, grama-são-carlos, grama-jesuíta | Nativa | Estolonífera | 0,015 | 0,0176 | 0,016 |
| Poaceae | <i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P. Beauv. | Gramma-missioneira | Nativa | Estolonífera | 0,011 | 0,0472 | 0,029 |
| Poaceae | <i>Bothriochloa laguroides</i> (DC.) Herter | Capim-pluma-branca, capim-cola- de-lebre, capim-pluminha-branca | Nativa | Touceira | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Poaceae | <i>Briza minor</i> L. | Capim-treme-treme | Naturalizada | Terófito | 0,039 | 0,0287 | 0,034 |
| Poaceae | <i>Bromus catharticus</i> Vahl | Cevadilha, aveia-louca | Nativa | Touceira | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Poaceae | <i>Chascolytrum rufum</i> J.Presl | Treme-treme, capim-treme-treme | Nativa | Touceira | 0,004 | 0,0009 | 0,003 |
| Poaceae | <i>Chascolytrum subaristatum</i> (Lam.) Desv. | Treme-treme, capim-treme-treme | Nativa | Touceira | 0,007 | 0,0032 | 0,005 |
| Poaceae | <i>Cinnagrostis viridiflavescens</i> (Poir.) P.M. Peterson. Soreng. Romasch. & Barberá | Capim-penacho | Nativa | Touceira | 0,011 | 0,0051 | 0,008 |
| Poaceae | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. | Gramma-paulista | Naturalizada | Rizomatosa | 0,004 | 0,0014 | 0,003 |
| Poaceae | <i>Dichanthelium sabulorum</i> (Lam.) Gould & C.A. Clark | Capim-sabulorum | Nativa | Decumbente | 0,013 | 0,0032 | 0,008 |
| Poaceae | <i>Digitaria eriantha</i> Steud. | Capim-pangola | Naturalizada | Touceira | 0,009 | 0,0023 | 0,006 |
| Poaceae | <i>Eragrostis neesii</i> Trin. | Capim-sereno | Nativa | Touceira | 0,007 | 0,0014 | 0,004 |

| FAMÍLIA | ESPÉCIE | NOME COMUM | ORIGEM | FORMA DE VIDA | FR | CR | IVI |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------|-------|--------|-------|
| Poaceae | <i>Lolium multiflorum</i> Lam. | Azevém | Naturalizada | Terófito | 0,004 | 0,0014 | 0,003 |
| Poaceae | <i>Mnesithea selloana</i> (Hack.) de Koning & Sosef | Capim-cola-de-lagarto | Nativa | Touceira | 0,009 | 0,0194 | 0,014 |
| Poaceae | <i>Nassella nutans</i> (Hack.) Barkworth | Flechilha | Nativa | Touceira | 0,002 | 0,0009 | 0,002 |
| Poaceae | <i>Paspalum notatum</i> Flügge | Gramma-forquilha | Nativa | Rizomatosa | 0,039 | 0,0620 | 0,051 |
| Poaceae | <i>Paspalum plicatulum</i> Michx. | Capim-coqueirinho | Nativa | Touceira | 0,026 | 0,0879 | 0,057 |
| Poaceae | <i>Paspalum urvillei</i> Steud. | Capim-das-roças, capim-das-estradas, | Nativa | Touceira | 0,020 | 0,0213 | 0,020 |
| Poaceae | <i>Piptochaetium montevidense</i> (Spreng.) Parodi | capim-cabelo-de-porco | Nativa | Touceira | 0,022 | 0,0157 | 0,019 |
| Poaceae | <i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev | Erva-de-penacho, rabo-de-cão | Naturalizada | Terófito | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Poaceae | <i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguelen | Capim-rabo-de-raposa | Nativa | Touceira | 0,004 | 0,0037 | 0,004 |
| Poaceae | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br. | Capim-moirão | Nativa | Touceira | 0,007 | 0,0032 | 0,005 |
| Poaceae | <i>Steinchisma decipiens</i> (Nees ex Trin.) W.V.Br. | - | Nativa | Touceira | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Poaceae | <i>Stenotaphrum secundatum</i> *(Walter) Kuntze | Gramma-da-praia | Nativa | Rizomatosa | 0,004 | 0,0241 | 0,014 |
| Poaceae | <i>Urochloa decumbens</i> (Stapf) R.D.Webster | Capim-braquiária | Naturalizada | Touceira | 0,004 | 0,0204 | 0,012 |
| Poaceae | * <i>Vulpia australis</i> (Nees ex Steud.) Blom | Vulpia | Nativa | Terófito | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Polygalaceae | <i>Polygala australis</i> A.W.Benn. | Polígala | Nativa | Terófito | 0,009 | 0,0019 | 0,005 |
| Primulaceae | * <i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U. Manns & Anderb. | Escarlate, morrião | Nativa | Terófito | 0,002 | 0,0046 | 0,003 |
| Primulaceae | * <i>Lysimachia mínima</i> (L.) U. Manns & Anderb. | - | Nativa | Terófito | 0,004 | 0,0009 | 0,003 |
| Rosaceae | * <i>Aphanes parodii</i> (I.M.Johnst.) Rothm. | - | Nativa | Terófito | 0,002 | 0,0019 | 0,002 |
| Rubiaceae | <i>Borreria verticillata</i> (L.) G.Mey. | Vassourinha-de-botão | Nativa | Erva lignificada | 0,020 | 0,0097 | 0,015 |
| Rubiaceae | <i>Galium hirtum</i> Lam. | - | Nativa | Decumbente | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |

| FAMÍLIA | ESPÉCIE | NOME COMUM | ORIGEM | FORMA DE VIDA | FR | CR | IVI |
|-------------|---|--|--------------|------------------|-------|--------|-------|
| Rubiaceae | <i>Richardia humistrata</i> (Cham. & Schltdl.) Steud. | - | Nativa | Decumbente | 0,024 | 0,0185 | 0,021 |
| Turneraceae | * <i>Piriqueta taubatensis</i> (Urb.) Arbo | Piriqueta | Nativa | Erva lignificada | 0,004 | 0,0009 | 0,003 |
| Urticaceae | <i>Parietaria debilis</i> G.Forst | Erva-pepino, erva-de-ganso | Naturalizada | Terófito | 0,002 | 0,0005 | 0,001 |
| Verbenaceae | <i>Verbena litoralis</i> Kunth | Erva-de-pai-caetano, gervãozinho-do-campo | Nativa | Erva lignificada | 0,004 | 0,0009 | 0,003 |

